

Impfkalender

aller allgemein empfohlenen Impfungen für **Säuglinge** und **Kleinkinder**

Alter → ↓ Impfung	1. Lebensjahr							2. Lebensjahr			5. Jahr	6. Jahr	
	7. Wo	3. Mo.	5. Mo.	6. Mo.	7. Mo.	11. Mo.	12. Mo.	13. Mo.	14. Mo.	20.-24. Mo.			
Rotavirus (RV)	RV 2 bzw. 3 in Abhängigkeit vom verwendeten Impfstoff, Abstand mind. 4 Wochen												
Diphtherie (DIP) Tetanus (TET) Pertussis (PEA) Poliomyelitis (IPV) Haemophilus infl. B (HiB) Hepatitis B (HBV)		1. 6-fach- Impfung	2. 6-fach- Impfung					3. 6-fach-Impfung frühestens 6 Monate nach 2. Teilimpfung					
Pneumokokken (PNC)		1. PNC	2. PNC					3. PNC frühestens 6 Monate nach 2. Teilimpfung					
Mumps Masern (MMR) Röteln							MMR 2 Impfungen, Abstand mind. 4 Wochen						
Meningokokken^{1,2} FSME							1 x MEC-C						
Varizellen (VZV)							1. FSME	2. FSME	3. FSME	FSME			
Hepatitis A (HAV)							VZV 2 Impfungen, Abstand mind. 4, vorzugsweise 6 Wochen						
Influenza (IV)³							HAV 2 Impfungen, Abstand 12 Monate						
							IV jährlich ⁴						

Impfkalender aller empfohlenen Impfungen für Säuglinge und Kleinkinder

Kostenfrei
 Nicht kostenfrei
 Indikationsimpfung (nicht kostenfrei)

¹ MEC-C: konjugierter MenC Impfstoff bei Erstimpfung ab dem vollendeten 12. Lebensmonat nur eine Dosis (kann ab dem vollendeten 2. Lebensmonat erstmals geimpft werden, dann 2 Dosen im Abstand von mind. 8 Wochen).

² MenB: Individualimpfung ab dem vollendeten 2. Lebensmonat; Indikationsimpfung für Risikopersonen; siehe Kapitel Meningokokken

³ IV: bei Kindern werden bei Erstimmunisierung (bis zum vollendeten 8. Lebensjahr) 2 Impfungen mit mind. 4 Wochen Abstand empfohlen.

⁴ Ab vollendeten 2. Lebensjahr nasaler Influenza-Lebendimpfstoff